

جدول په ذهن وسپاری	
الکول	ایتر
نیزاب عضوی	ایسر
سایکلو الکان	الکین ها
الدهاید	کیتون ها
سایکلو الکین	الکین ها

یادښت: د عضوي مرکباتو د زیاتوالي اصلي علت د هغوی د ایزومیري ځانګړتیا ده.

**د عضوي مرکباتو ډل بندۍ**

**عمومي معلومات:**

هغه عضوي مرکبات چې شمېر یې له شلو میلیونو څخه زیات دی، د کاربن د زنجیري جوړښت (کاربنی اسکلیټ) او یا د فعاله ګروپونو د موجودیت پر اساس ډل بندۍ. د کاربن اتومونو ترمنځ د اړیکو ډول هم د عضوي مرکباتو په طبقه‌بندي کې بنسټیز رول لري.

د کاربنی اسکلیټ د جوړښت په پام کې کې نیلو سره، عضوي مرکبونه په دوو ډلو ویشل شوي دي چې د زنجیر اسکلیک (Acyclic) او کریز (cyclic) مرکبونه دي.


**د دوولسم ټولگي د کيميا تعليمي لارښود - درېيمه دوره**

**تعليمي موخې**


1. فضايي ایزومیري
2. طبقه د عضوي مرکبونو ډل بندۍ
3. د عضوي مرکبونه او وظیفه یی ګروپونه (د هایډرو کاربنونو مشتقات)
4. د وظیفوی ګروپونو خصوصیات

الف: جوړښتیزې ایزومیري او د دوه ګونو اړیکو ځای

مثال:



1-Butene



2-Butene

دواړه مرکبات عمومي فورمول  $C_4H_8$  ورته لري، خو د دواړو مرکباتو ساختماني فورمولونه له یو بل سره توپیر لري، او د دوه ګوني اړیکې موقعیت په دې مرکباتو کې له یو بل سره توپیر لري. دغه ډول ایزومری ته د دوه ګوني اړیکې د موقعیت له مخې ساختماني ایزومری ویل کېږي.

ب: فضايي ایزومیر (Stereo isomeris)

Stereo یوناني کلمه ده چې د جامدو او کلکو جسمونو په معنا ده، نو فضايي ایزومیري Stereo isomeris یوازې هغو مرکبونو پورې اړه لري چې کلک فضايي جوړښت ولری او د هغوی هندسی شکل فضايي بدلولون نه مومی.

یادونه: الکینونه د سایکلو الکانونو سره ایزومیر وي، او الکاینونه د سایکلو الکینونو سره ایزومیر وي. د بیلګې په توګه، یو مرکب چې عمومي فورمول یې ورکړل شوی،  $C_3H_6$  کېدای شي نېروپین وي یا سایکلو پروپان.

$\square NH_2$	$R \square NH_2$	امين	$CH_3 \square NH_2$
$\square CO \square NH_2$	$R \square CO \square NH_2$	امايډ	$C_3 H_7 \square CO \square NH_2$
$\square SH$	$R \square SH$	مرکېتان	$CH_3 \square SH$
$\square S \square$	$R \square S \square R$	تليو اټيز	$CH_3 \square S \square CH_3$
$\square SO_3 H$	$R \square SO_3 H$	سلفو	$C_6 H_5 \square SO_3 H$
		اسيد انهيډرېټ	
	$R - O - O -$	پراکسايډ ها	
$-CN$	$R - CN$	نټريل	$CH_3 - CN$


زنځيري مرکبات هغه ډول مرکبات دي چې پرانيستي زنځير لري او اساس يې د اليفاتیک هايډروکاربنونو جوړښت تشکيلوي.

1. هايډروکاربنونه : ددې مرکبونو ماليکولونه يوازې د کاربن او هايروجن له اتومونو څخه جوړ شوي دي ، دا مرکبونه کيدای شي مشبوع ، لکه الکانونه ( دو گوني رابطي لرونکي ) (Alkanes) او يا غير مشبوع د دوه گوني (Alkenes) او درې گوني (Alkynes) اړيکي او الکانونه دوه گوني رابطي (Alkadienes) وي

2. کړی یز مرکبونه (Cyclo Compound) : دغه مرکبات په خپلو ماليکولونو کې تړلي زنځيري جوړښت په بڼه د حلقې لري، او د جوړونکو اتومونو د ډول پر اساس په کاربوسايکلک (Carbocyclic) او هتروسايکلک (Hetrocyclic) ډولونو طبقه بندي شوي دي.

3. کاربوکسليک (Carbocyclic) : په دې ډول مرکباتو کې حلقه يوازې له کاربن اتومونو جوړ شوې ده، او د کيمياوي ځانگړتياوو د توپير له مخې په دوه ډلې ويشل شوي دي: اليکسليک (Alicyclic) او اروماتيک (Aromatic) دی

د عضوي مرکباتو يا هايډروکاربنونو ډول بندۍ




وظيفوی گروپونه: هغه اتومونه يا د اتومونو ډلې دي چې په هايډروکاربن ماليکولونو کې ځانگړی او مشخص جوړښت لري او د عضوي مرکباتو د کيمياوي او فزيکي ځانگړتياوو څرگندېدو لامل گرځي. هغه هايډروکاربنونه چې يو شان فعاله گروپ ولري، کيمياوي او فزيکي ځانگړتياوي يې هم ورته وي.

کله چې د هايډروکاربن يوه هايډروجن د فعال گروپ يا فعاله گروپ په ځای کې بدل شي، نو د مربوطه هايډروکاربن مشتقات ترلاسه کېږي.

يادښت: عضوي مرکبات د موجودو فعاله گروپونو له مخې په درې لاندي ډلې ويشل شوي دي

## د هایډروکاربنونو ګروپونه

Alkanes	$CH_3 - CH_3$	ایتان	-
Alkenes	$CH_2 = CH_2$	ایتلین یا ایتیلین	د نوکلئوفیلیک پاتې شونی
Alkynes	$CH \equiv CH$	ایتاین یا استیلین	د نوکلئوفیلیک پاتې شونی
Alkadienes	$CH_2 = CHCH = CH_2$	1,3- بیوتاداین	د نوکلئوفیلیک پاتې شونی
Arenes		بنزین	داروماتیکو الکتروفیلیک بې ځایه کونه

کونی دنده

1. ایزومیر هندسي څه ډول ایزومري ده؟ توضیح ورکړئ
2. هتروسایکلک کومو مرکباتو ته ویل کېږي؟
3. فعاله ګروپونه د اینتر، کیتون، او الډیهایډ لپاره ولیکئ.
4. هایډروکاربنونه څو ډلو ویشل شوي دي؟ نومونه یې ولیکئ.