


2 - اينوفلوئيډي (Aneuploidy mutation)

په دې ډول موتېشن کې يو يا څو عدده جسمي يا جنسي کروموزونه کمېږي يا زياتېږي ، د بېلګې په توګه $(2n-1, 2n+1)$ زياتره وخت دا ډول موتېشن واقع کېږي، (يووېشتم تريزومي) يوه ښه بېلګه د جسمي کروموزوم زياتوالي دی .

جينومي موتېشن د موتېشنونو له جملې څخه يوه له تر ټولو خطرناکو ډولونو څخه ده، ځکه چې دا د حجرې ټول جنيټي نظم ګډوډوي

لور ته ورته د وينې کموالي (Sickle Cell Anemia)

يوه جنيټي ناروغي ده چې د هيموګلوبين په جين کې د موتېشن له امله رامنځته کېږي، او د دې له کبله د وينې سرې حجرې د خپل عادي ډيسک شکل څخه د داس شکل (Sickle-shaped) ښه خپلوي. په عادي حالت کې د وينې سرې حجرې فليټي او ګردې (ډيسک مانند) وي، خو په دې اختلال کې دا حجرې د داس په څېر اوږدې او کړې شي. په افريقا کې نږدې له هر 12 کسانو څخه يو د دې اختلال (سيکل سلي ناروغي) سره مخ وي.



(۲-۳) شکل: لور ته ورته د وينې حجره

د دوولسم ټولگي د بيولوژي تعليمي لارښود - درېمه دوره (له ۲۴ تر ۳۵ صفحه)

هدف: زده کوونکي بايد د کروموزومي بېنظميو مختلف ډولونه وپېژني او ورسره آشنا شي.

د جينومي موتېشن (Genomic Mutation): هغه موتېشن ته ويل کېږي چې د کروموزومونو په ټول شمېر کې بدلون راولي، نه په ځانګړي جين يا د کروموزوم په جوړښت کې.

تشریح

- د هر ژوندي موجود جينوم معمولاً يو ټاکلی شمېر کروموزومونه لري، د بېلګې په توګه، په انسان کې ۴۶ کروموزومه (۲۳ جوړې) شته.
- که د دې کروموزومونو شمېر له عادي حالت څخه زيات يا کم شي، نو دا بدلون په جينومي کچه موتېشن بلل کېږي.

د موتېشنونو اغېزې

ډېرې جنيټي ناروغي لکه: سرطان، د وينې کمښت، او ځينې رواني اختلالات، د همدې ډول موتېشنونو له امله منځ ته راځي د شکرې لومړی ډول (Diabetes Type 1)

ګټورې پايله

ځيني موتېشنونه بيا مثبت اغېز لري، لکه هغه بدلونونه چې د HIV وېروس پر وړاندې د بدن مقاومت زياتوي.

د جينومي موتېشن ډولونه (Types of Genomic Mutation)

1 - پولي پلوئيډي (Ploidy Mutation)

په دې ډول موتېشن کې د کروموزونو يو يا څو مجموعی زياتېږی $(4n-3n)$ که چېرې دا ډول موتېشن په انسانو کې منځته راشي، په جينومي پړاو کې له منځه ځي، د زېږېدنې له وخت څخه مخکې د مېرو ماشومانو پيدا کېدل د دې موتېشن نتيجه ده، خو پر عکس نباتي پولي پلوئيډ د نباتاتو په تکامل او زيات حاصل ورکولو کې مهم رول لري .

پاڼونه:

دغه ډول موتېشنونه زياتره په نباتاتو کې ليدل کېږي، او کله ناکله د نبات د ودې يا د نوي ډولونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي.

سیسټیک فیبروسس څه دی؟

تعریف: سیسټیک فیبروسس یوه موروثي جنیټیک ناروغي ده چې په بدن کې په بېلابېلو برخو، په ځانګړي توګه سږو (ریښه) او هضمي دستگاه کې، غیر عادي او غلیظ مخاط (Mucus) تولیدوي.

اصلي علت: دا ناروغي د موټېشن په ځانګړي جین CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) کې منځ ته راځي.

1. د CFTR جین موقعیت په کروموسوم نمبر 8 کې دی.
2. دا جین د یو پروټین تولید مسؤل دی چې د حجرې په غشا کې د کلوراید (Cl⁻) انتقال تنظیموي.
3. کله چې په دې جین کې موټېشن واقع شي، پروټین په سمه توګه کار نه کوي، او په پایله کې غلیظ او چسبنده مخاط په بدن کې راټولېږي.

د دې ناروغي حساسې برخې

1. سږي: د تنفسي لارو د بندېدو او انتاناتو له امله زیانمن کېږي.
2. هضمي دستگاه (کولمې او پانکراس): د خوړو د هضم او جذب ستونزې رامنځته کوي.
3. د خولو غدې: په خولو کې د مالګې کچه غیر عادي زیاته کېږي.

د ناروغي وراثت

1. دا اختلال په مغلوب (Recessive) ډول د وراثت له لارې انتقالیږي.
2. یعنې یو فرد باید د CFTR جین دوه معیوبې نسخې ترلاسه کړي (یوه له پلار او یوه له مور) ترڅو ناروغ شي.
3. که یوازې یوه معیوبه نسخه ولري، هغه کس د ناروغي حامل ګڼل کېږي، خو پخپله ناروغ نه کېږي.

یادونه د کتاب له مخې: دا ناروغي د جیني موټېشن (Gene Mutation) یوه بېلګه ده چې د یو واحد معیوب جین (Single Mutated Gene) له امله منځ ته راځي، د دې بېلګې هدف دا دی چې د موټېشنونو اغېز پر صحت انسانانو وښيي

عضو/ د بدن برخه	اغېزه
سږي	د تنفسي لارو بندېدل، سخت ټوخي، تکراري انتانات
کولمې او پانکراس	د خوړو د هضم ګډوډي، د موادو کم جذب، د وزن کمېدل
د خولې غدې	په خولو کې د مالګې د کچې زیاتوالی (له عادي حده ډېر)

علمي
جزئیات:

1. په دې موټېشن کې د گلوټامیک اسید (Glutamic acid) پر ځای والین (Valine) د هیموګلوبین د زنجیر په جوړښت کې ځای نیسي.
2. د دې بدلون له امله د وینې سرې حجرې د داس په څېر بڼه اخلي او اکسیجن په سمه توګه انتقالولی نه شي.
3. دغه داسې شکل حجرې په رګونو کې بند پاتې کېږي او د شدیدو دردونو، کمخوني، او د بدن د نسجونو د زیان لامل ګرځي.



نوي څېړني

1. جین درملنه (Gene Therapy) دا مهال د ازموینو په مرحله کې ده، چې هدف یې د داسخوني ناروغانو کې معیوب جین سمول دي.
2. د CRISPR تکنالوژي په څو ازمايننتي مواردو کې د دې ناروغي بریالی درملنه ښودلې ده، او ناروغان یې له جدي نښو خلاص کړي دي.
3. د دې ناروغي یوازینی ګټور خصوصیت دا دی چې هغه کسان چې دا موټېشن لري، د ملاریا ناروغي پر وړاندې مقاومت لري.

کتاب کی یادونه

دا حالت د کروموزومونو په شمېر کې د موټیشن (جینومي موټیشن) مثال په توګه تشریح شوی او ټرنرز سندرم داون د دې یوه څرګنده بېلګه بلل شوي ده.


تريزومي یوويشتم نېبی (ټرنرز سندرم داون)

عنوان	معلومات
علمی نوم	Trisomy یوويشتم
عام نوم	ټرنرز سندرم داون (Down syndrome)
د موټیشن ډول	جینومي (تريزومي)
کروموزوم شمېر	47 (دری نسجي کروموزوم یوويشتم)
اغېزه	ذهني ځنډ، ځانګړی مخ، فزيکي ستونزې

توضیح	خصوصیات
جینومي (اینوفلویدي - تريزومي)	د موټیشن ډول
کروموزوم شمېر یوويشتم	د ځای بدلون
47 پر ځای 46	کروموزومو شمېر
زیاتره د میوز په تقسیم (د ګامتونو په جوړېدو) کې پیښېږي	د رامنځته کېدو ځرنګوالي

د تريزومي یوويشتم (ټرنرز سندرم داون) جینیټیک علت

- د مادې د عمر د زیاتوالي سره د دې امکان ډېرېږي چې ماشوم د تريزومي یوويشتم سره زیږېدیده شي، په ځانګړي ډول د 35 کلنې وروسته.
- په اوسط ډول، له هر 700 زیږونونو څخه یو ماشوم ممکن د ټرنرز سندرم داون لرونکی وي.



(۳-۲): شکل: د تريزومي په بې نظمی اخته ماشوم د کروموزومونو کاربوګرام (یا په هسته کې د کروموزومونو ښودنه) لیدل کېږي

تشریح	خصوصیات
سیسټیک فیروسیس	د ناروغی نوم
جيني په (CFTR) جين کې	د موټیشن ډول
کروموزوم 7	د جين موقعیت
مغلوب (recessive)	د وراثت ډول
سري ، پانکراس ، کولمې، د خولو غدې	اغېزمن غړي
غلظت مخاط، د تنفس او د خوړو د هضم ستونزې	پایله

ولي مخاط غلظت کېږي؟

- د CFTR پروټین دنده دا ده چې کلوراید یونونه په سمه توګه د حجري له غشا څخه تېر کړي. کله چې دا پروټین کار ونه کړي:
1. اوبه لږ حجري ته داخلېږي،
 2. په نتیجه کې مخاط غلظت، چسبناک او غیر طبیعي جوړېږي.

د ژوند موده

1. په تېرو وختونو کې، د دې ناروغی لرونکي ماشومان معمولاً تر ځوانۍ نه ژوندي پاتې کېدل.
2. خو اوس، د نوو درملو لکه Ivacaftor او Trixacar په مرسته، ناروغان کولای شي تر 40-50 کلنۍ یا زیات عمر وکړي.

مخنیوی

- په پرمختللو هېوادونو کې د زیږون مخکې جینیټیک آزموینې ترسره کېږي، ترڅو زوجین پوه شي چې آیا د CFTR معیوب جین ناقل دي که نه.
- دا کار د ناروغی د انتقال د مخنیوي لپاره م

تريزومي یوويشتم څه شی دی؟

تعریف: تريزومي یوويشتم یوه جینومي موټیشن ده چې په کې یو فرد د کروموزوم نمبر یوويشتم پر ځای درې کروموزومونه لري، نه دوه. دا حالت ټرنرز سندرم داون (Down Syndrome) رامنځته کوي.

ولي ورته "تريزومي" ويل کېږي؟

1. "تری" = درې
2. "سومي" = په یوه جوړه کې د اضافي کروموزوم شتون
3. په عادي حالت کې هر انسان 2 کروموزومونه د نمبر یوويشتم لري (یوه له پلار، یوه له مور).
4. خو په تريزومي یوويشتم کې، 3 کروموزومونه د نمبر یوويشتم وي.

د کروموزومي نښې

نښې	توضیح
قد لنډ	د بدن ورو وده
نازایی	تخمدانونه بشپړ وده نه کوي، میاشتنی دوره نه لري
غټ گردن	غټ گردن او اضافه پوست (Webbed neck)
د سینه (تپي) پراخوالی	تپي له یو بل څخه لیرې
د زړه او پښتورګو ستونزې	په ځینو افرادو کې
د زده کړې ستونزې	کله ناکله په ریاضیاتو او فضايي حافظه کې

کلینیفټر سندروم د کروموزومونو د شمېر په موټیشن (جنسي تریزومي) یوه بېلګه ګڼل کېږي او ښيي چې دا ډول موټیشن د جنسي ځانګړتیاوو په بدلون کې اغېز

د رامنځته کېدو څرنگوالی

1. د میوز تقسیم په جریان کې کېدای شي د جنسي کروموزومونو X په سمه توګه جلا نه شي.
2. په پایله کې، د ګامت (اسپرم یا تخمک) دوه X کروموزومونه لري، او کله چې د Y کروموزوم سره یو ځای شي، ترکیب XXYY رامنځته کېږي.

بی‌نظمي یا اختلال کروموزومي څه شی دی؟

بی‌نظمي‌های کروموزومي هغه بدلونونه دي چې په کروموزومونو کې د شمېر یا جوړښت په برخه کې راځي.

دغه بدلونونه کولای شي د جینېټیک ناروغيو لکه:

- سندروم داون (تریزومي یوویستم)،
 - سندروم ترنر،
 - سندروم کلاینفلتر
- او نورو لامل شي.

ټرنر سندروم ترنر (Turner Syndrome)

تعریف: ټرنر سندروم ترنر یوه جینومي موټیشن (آنوپلوئیډی) ناروغي ده چې یوازې په ښځو کې پیښېږي، او په کې یو جنسي کروموزوم X له لاسه تللی یا ناقص وي.

1. یعنې فرد یوازې یو X کروموزوم لري، پر ځای د دوه (XX)

کتاب کې یادونه

ټرنر سندروم ترنر د جینومي موټیشن یوه بېلګه په توګه ذکر شوی، چې د د کروموزومونو د شمېر کمېدو (مونوسومي) له امله منځ ته راځي.

ټرنر سندروم نښې

نښې	توضیح
قد له عادي څخه لوړ	د استخواني وده ډېره
کوچنی هګی	هګی (بیضه) بشپړ نه وده کوي
نازایی	زیاتره خلک د اسپرم تولید نشي کولی
د تپيو وده (Gynaecomastia)	کله ناکله د نسبي تي د ودي سره مل
اوږد غږ	د عادي نارینه وو په پرتله، غږ لږ خشن
د زده کړې ستونزې	په ځانګړي ډول د ژبې او تمرکز ستونزې

د رامنځته کېدو څرنگوالی

1. په میوز مرحله کې (د جنسي حجری تقسیم) یو X کروموزوم له منځه ځي یا انتقال نه کېږي.
2. زیاتره وخت دا تصادفي پیښه ده او د والدينو له وراثت سره تړاو نه لري.

کلینیفټر سندروم

1. یوه جینومي موټیشن (آنوپلوئیډي) ده چې په نارینه وو کې منځ ته راځي.
2. په کې نارینه یو اضافي X کروموزوم لري، یعنې ترکیب جنسي یې XXYY دی، پر ځای د عادي XY.

ولی د وخت په پیل کې تشخیص مهم دی؟
د دې بی‌نظمیو ژر تشخیص د جنین په وده کې کورنۍ او ډاکټرانو سره مرسته کوي چې:

1. د جنین وضعیت وپېژني.
2. د حامله‌ګۍ د دوام یا ختمولو په اړه خبر پرېکړه وکړي.
3. د مریض ماشوم د ساتنې لپاره اړین چمتووالي وکړي.

د زېږون مخکې د تشخیص میتودونه (Prenatal Diagnostic Tests)

□ آمنیوسنټز (Amniocentesis)

1. څه شی دی؟ د امینوتیک مایع څخه نمونه اخیستل (هغه مایع چې جنین پکې وي).
2. کله ترسره کېږي؟ معمولاً د حمل د 15-20 اونیو تر منځ.
3. څه کار کوي؟ د جنین حجرې له مایع څخه اخیستل کېږي ترڅو کروموزومونه وڅېړل شي (Karyotype).

د کومو ناروغیو لپاره؟

1. تریزومي یوېشتم (Down syndrome)
2. سندروم ترنر
3. کلینفلټر سندروم
4. او نور کروموزومي اختلالونه

نمونه‌پرډاری د کوریان (CVS - Chorionic Villus Sampling)

1. څه شی دی؟ د جفت (کوریان) یوه برخه څخه نمونه اخیستل.
2. کله ترسره کېږي؟ د حمل د 10-12 اونیو تر منځ.
3. ګټه: د آمنیوسنټز په پرتله ژر ترسره کېږي.
4. زیان: د آمنیوسنټز په پرتله د جنین د سقط لږ زیات خطر لري.

□ د مور د وینې ازموینه (Non-Invasive Prenatal Testing - NIPT)

1. څه شی دی؟ د جنین DNA چې په مور کې د وینې له لارې شتون لري، وڅېړل کېږي.
2. کله ترسره کېږي؟ د حمل د 9 اونیو څخه وروسته.
3. ګټه: بی‌تیرونه او غیر تهاجمي ده؛ د سقط خطر نه لري.
4. تشخیص وړتیا: د تریزومي 21، 18 او 13 لپاره ډېر دقیق دی.

تخصصی سونوګرافي (Ultrasound)


1. څه کوي؟ د جنین ظاهري بڼه څېړي، په ځانګړي ډول د ساختماني ناهنجاریو لکه د زړه، مغز، یا ملا د ستون ناهنجاریو د تشخیص لپاره.

د کاریوتایپ اهمیت (Karyotyping)

1. د کروموزومونو د نقشه جوړولو لپاره کاري اهمیت لري.
2. کاریوتایپ د فرد کروموزومونه په تفصیل سره ښيي.
3. د دې میتود په مرسته د تریزومي (Trisomy) او مونوسومي (Monosomy) اختلالات تشخیص کېږي.

د زېږون وروسته جینیټیک ازموینې

هدف: د زېږون وروسته ازموینې د نوزاد یا ماشوم په جیني یا کروموزومي اختلالاتو د تشخیص لپاره ترسره کېږي، په هغه حالت کې چې ظاهري یا طبي نښې موجود وي او د موتیشن یا سندروم ترنر شک وي.




د زېږون وروسته د ازموینې ډولونه

□ کاریوتایپ (Karyotyping)

1. څه شی دی؟ د نوزاد د کروموزومونو نقشه وڅېړل.
2. د څه لپاره؟ د سندروم ډاون، سندروم ترنر، کلینفلټر، او نورو تریزومي او مونوسومي اختلالاتو تشخیص.
3. څنګه ترسره کېږي؟ د وینې نمونه اخیستل کېږي، کروموزومونه رنګ‌کاري کېږي او مشاهده کېږي.

آزمایش آمنیوسنټز در بارداری



فصل درېیم: جینیتیک انجنیری او DNA

هدف:


د زده‌کوونکو پېژندنه د جینیتیک علم او د DNA د کشف مراحل سره.

د جینیتیک انجنیری څه شی دی؟

جینیتیک انجنیری د بیوټکنالوژۍ یوه څانګه ده چې پکې د ژوندیو موجوداتو DNA تعدیل یا دستګارۍ کېږي ترڅو ځانګړي ځانګړتیاوې ترلاسه شي.

د جینیتیک انجنیری مهم مراحل

1. د هدف جین تشخیص
2. د جین پرې کول د ځانګړو انزایمونو په مرسته (لکه Restriction Enzymes)
3. د جین ځای پر ځای کول په DNA کې د پل موجود سره د ناقل (Plasmid) په مرسته
4. نوی DNA د میزبان حجرې دننه کول
5. د حجرې تولید او د جین محصول جوړول (لکه پروټین، هورمون او نور



FISH (Fluorescence In Situ Hybridization)

1. څه شی دی؟ د فلوروسنت رنګونو څخه کار اخیستل ترڅو په کروموزومونو کې د ځانګړو جینونو موقعیت معلوم شي.
2. ګټه: د کاربوټایپ په پرتله چټک دی؛ د سندروم داون، دی‌جورج، او نورو اختلالاتو د ژر تشخیص لپاره مناسب.

د نوزادو د بیوشیمیایي ازموینې (Newborn Screening)

1. څه شی دی؟ د نوزاد په بدن کې د انزایمونو او کیمیاوي موادو کچه څېړل ترڅو د میتابولیک یا موروثي ناروغيو تشخیص وشي.
2. په افغانستان او پرمختللو هېوادونو کې شامل:
 1. فنیل‌کیتونوریا (PKU)
 2. ګالاکتوزمیا
 3. کمکاری مادرزادی تیروئید
 4. سپستیک فیبروسیس
3. څنګه ترسره کېږي؟ د نوزاد د پښې له څنډې د وینې څو څاڅکي اخیستل کېږي څو ورځې وروسته د زیږون.

د DNA ټولګی یابي (DNA Sequencing)

1. څه شی دی؟ د DNA د نوکلئوټیدونو دقیق ترتیب څېړل ترڅو په ځانګړو جینونو کې موټېشنونه وپېژندل شي.
2. د څه لپاره کارول کېږي؟ د نادر جیني ناروغيو یا هغو اختلالاتو لپاره چې کاربوټایپ یې نه پېژني.
3. بېلګې:
 1. د CFTR جین ټولګی د سپستیک فیبروسیس تشخیص لپاره
 2. د BRCA جین ټولګی د سرطانو لپاره

یادونه

1. د زیږون وروسته ژر تشخیص ماشوم ته اجازه ورکوي چې په وخت سره مرستندویه درملنه، دارو، غذايي رژیم یا تعلیمي مداخلې ترلاسه کړي.
2. په ځینو هېوادونو کې، دغه ازموینې اجباري او وړیا دي ترڅو د ذهني ځنډ یا دایمي ناتوانیو مخنیوی وشي.

د جنيتکي انجنيري کارونې

1. د انسان انسولين د بکتريو په مرسته توليدول
2. هغو بوټو ته مقاومت ورکول چې پر آفتونو اغيزمن وي
3. ترانسجينیک حيوانات د زيات توليد لپاره
4. د جنيتکي ناروغيو درملنه (جين تراپي)

فريډريک ميشر 1869 – (Friedrich Miescher)

1. لومړی کس و چې DNA يې کشف کړ.
2. هغه يو ماده د سپينو وينې د حجرو څخه جلا کړه او ورته يې (نوکلئين) (nuclein) نوم ورکړ.
3. په هغه وخت کې يې نه پوهيده چې دا ماده د جنيتکي نقش لري، خو پوهيده چې د حجري په هسته کې شتون لري.

د گريفيت تجربه 1928 – (Frederick Griffith)


1. هغه د هغو بکترياوو سره تجربه وکړه چې په مورکانو کې د سينې اوبنکې ناروغي رامنځته کول.
2. پوه شو چې معلومات له يوې بکتريا څخه بلې ته انتقاليري؛ دې پېښې ته يې "تبدیل" (Transformation) نوم ورکړ.
3. هغه پخپله نه پوهيده چې دا منتقل کېدونکې ماده DNA ده.

د DNA ساختماني ماډل – کال 1953

1. جيمز واتسون (Watson) او فرانسس کريک (Crick) د روزلند فرانکلين د ايکس رې عکسونو په مرسته د دوگوني مارپيچ (double helix) ماډل معرفي کړ.
2. دا کشف د جنيتک پوهې، د پروټين جوړونې او د جنيتکي انجنيري د پوهېدو لار پرانستله.

DNA يا دى ان اى څه شى دى؟

DNA د Deoxyribonucleic Acid لنډيز دى، يعنې د ډيوکسي رايبونوکلئیک تيزاب. دا ماده په ټولو ژونديو حجرو کې شتون لري او د جنيتکي معلوماتو ځخيره کوي.



د DNA جوړښت

1. د دوگوني مارپيچ (double helix) په څير د زينو (ليډر) شکل لري.

له دوو تارونو جوړ شوی چې هر يو يې لري

- 1 - د ډيوکسي رايبوز شکر
- 2 - د فاسفيټ ډله
- 3 - د نايټروجن بنسټونه: آډنين (A)، ټيمين (T)، گوانين (G)، سايتوزين (C)
- 4 - آډنين د ټيمين سره (A-T) او گوانين د سايتوزين سره (G-C) جفتيري.

2. د DNA دنډې

1. د ميراثي معلوماتو ساتنه
2. د صفاتو د انتقال له والدينو څخه ماشومانو ته
3. د پروټينونو د جوړولو لارښوونه د RNA په مرسته

د ميراثي مادې کشف

د گريفيت تجربه: (Griffith – 1928)

1. گريفيت د سينه بېغل د ناروغی د دوو ډول بکتریاوو په مرسته تجربه وکړه:
S ډول: نرم او وژونکی
R ډول: زير او غير وژونکی
2. کله چې د وژل شوي S ډول بکتریا له ژوندی R ډول سره گډه شوه، مورک مړ شو.
3. هغه پوه شو چې يوه ناپېژندل شوې ماده د S بکتریا څخه R ته انتقال شوې ده.
4. هغه دې پېښې ته "تبدیل (Transformation) "نوم ورکړ.

د DNA د ميراثي ماده په توګه پېژندنه

د ايوري، مک لنود او مک کارتي تجربه: (Avery, MacLeod & McCarty – 1944)

1. هغوی د تبدیلولوګي ماده دقیقې څېړنې وکړې.
2. بې ثابت کرل چې DNA د تبدیل مسؤول دی، نه پروتین یا نور مواد.

وروستی ثبوت د هرسي او چيس لخوا (Hershey & Chase – 1952)

1. هغوی د بکتریاوفاژ ویروس څخه کار واخیست چې یوازې له DNA او پروتین جوړ شوی و.
DNA د Phosphorus-32 او پروتین د Sulfur-35 په مرسته نښه کرل شو.
2. کله چې ویروس پر بکتریا برید وکړ، یوازې DNA د حجري دننه شو او د نوي ویروسونو تولید یې ممکن کړ.
3. نتیجه DNA: د ميراثي ماده ده.

د DNA جوړښت کشف

جیمز واتسون او فرانسس کریک: (1953)

1. د روزلند فرانکلین د X-Ray عکسونو په مرسته یې د DNA دوهمگوني مارپیچ جوړښت تشریح کړ.
2. له دوو تکميلي تارونو جوړ شوی چې د زینو په څیر تاوېدلی دی.
3. د نایتروجن بنسټونه په جفتونو سره یو بل سره نښلول کېږي:
A د T سره
G د C سره

مهم ټکی د ازمويني لپاره

1. ميراثي ماده: DNA
2. د گريفيت تجربه: د "تبدیل" پېښې کشف
3. د ايوري او همکارانو تجربه DNA: د تبدیل مسؤول دی
4. د هرسي او چيس تجربه: د DNA د ميراثي ماده په توګه وروستی ثبوت
5. د DNA جوړښت: د واتسون او کریک لخوا


د DNA مالیکولي جوړښت

عمومي تعريف: DNA يا د ډيوکسي رايبونوکلنيک تيزاب يو پوليمر دی چې له کوچنيو واحدونو په نامه نوکلېوټايډونو جوړ شوی او د ميراثي معلوماتو ذخيره کوي.

د DNA د يوې نوکلېوټايډ واحد جوړونکي برخې هر نوکلېوټايډ له دريو برخو جوړ شوی دی:

1. د ډيوکسي رايبوز شکر (يو پنځه کربنه شکر)
2. د فاسفيټ ډله (Phosphate)


• د نايټروجن بنسټونه (څلور ډولونه): آډنين (A) ، تيمين (T) ، گوانين (G) ، سايتوزين (C)



U يوراسيل

C سايتوسين

T تيمين



G گوانين

A آډنين

د نايټروجن بنسټونو جفتيدل (تكميلي قاعدې)

1. آډنين هميشه د تيمين سره جفتيري (A=T)

2. گوانين هميشه د سايتوزين سره جفتيري (G=C)

دا جفتونه د هايډروجنې اړيکو په واسطه يو بل سره تړل شوي

1. A-T = دوه هايډروجنې اړيکې

2. G-C = درې هايډروجنې اړيکې

✓ د DNA د شکل جوړښت

1. DNA له دوو مارپيچ تارونو (Double Helix) جوړ شوی دی.

2. دا دوه تارونه يو بل ته تکميلي او متضاد دي.

3. تارونه د شکر او فاسفيټ په مرسته په اوږدو کې سره وصل شوي (د زينو څنډې).

4. نايټروجن بنسټونه په منځ کې موقعيت لري او د تکميلي جفتونو په شکل سره تړل شوي (د زينو پلې).

د DNA د جوړښت مهمې ځانگړنې

توضیح	خصوصيات
له دوو تکميلي تارونو جوړ شوی دی	دوه رشتينې
تارونه په مارپيچ ډول تاوېدلي دي	مارپيچي
د نايټروجن بنسټونه د ځانگړې قاعدې له مخې يو بل سره جفتيري	د تکميلي ځانگړتياوې
هر تار د '5 څخه تر '3 پورې او مقابل يې د '3 څخه تر '5 پورې دی	جهت لرونکی

نتيجه:

د DNA ماليکولي جوړښت ډېر دقيق او منظم دی، چې دا اجازه ورکوي ترڅو معلومات په ثابت، د انتقال وړ او د نسلونو په اوږدو کې د تکثير وړ ډول وساتل شي.

DNA او RNA ترمنځ توپیر


1. بشپړ نوم DNA: Deoxyribonucleic Acid (تیزاب دټوکسی رابینونوکلئیک) او RNA: Ribonucleic Acid (تیزاب رابینونوکلئیک) دی.
2. شکر DNA: ډیوکسی رابینوز لري، خو RNA رابینوز لري.
3. د تار جوړښت DNA: دوهمتاره (Double-stranded) دی، RNA یوه تاره (Single-stranded) دی.
4. نایتروجن بنسټونه DNA: کې آډنین (A)، تیمین (T)، گوانین (G)، سایټوزین (C) شته، خو RNA کې آډنین (A)، یوراسیل (U)، گوانین (G)، سایټوزین (C) شته.
5. د تیمین ځای DNA: تیمین (T) لري، خو RNA تیمین نه لري او پر ځای یې یوراسیل (U) لري.
6. د شتون ځای DNA: په حجره هسته او میتوکنډریا کې موندل کېږي، RNA په هسته، سیتوپلازم او ریبوزومونو کې شتون لري.
7. اصلي دنده DNA: د میراثي معلوماتو ذخیره او انتقال کوي، او RNA د DNA د معلوماتو پر اساس د پروتین جوړولو لارښوونه کوي.
8. ډولونه DNA: یوازې یو ډول لري، خو RNA څو ډولونه لري mRNA، tRNA، rRNA.
9. ثبات DNA: ډېر ثابت دی، خو RNA نسبتاً ناپایدار دی.

د توپيرونو خلاصه

1. DNA دایمي د معلوماتو کتابتون په څېر دی، پداسې حال کې چې RNA د دې معلوماتو پیامرسان او عملي کوونکی دی.
2. DNA یوازې په هسته کې پاتې کېږي، خو RNA کولای شي په حجره کې وگرځي.
3. په RNA کې د تیمین پر ځای یوراسیل شتون لري.

د RNA رولونه په حجره کې

1. mRNA پیغام رسونکي: د DNA ژنتیکي معلومات ریبوزوم ته انتقالوي.
2. tRNA لپړدونی: امینواسیدونه ریبوزوم ته رسوي.
3. rRNA ریبوزومي: د ریبوزوم یوه مهمه برخه جوړوي.



د RNA ډولونه (تیزاب رابینونوکلئیک)

د RNA اصلي ډولونه لري چې هر یو یې د پروتین جوړولو په برخه کې ځانګړې دنده لري:

1. پیامرسان (mRNA) Messenger RNA

تعریف:

mRNA د DNA ژنتیکي معلومات له هسته څخه اخلي او په سیتوپلازم کې ریبوزوم ته انتقالوي.

د mRNA دنده

1. د «پیامرسان» رول ترسره کوي.
2. د پروتین جوړولو لپاره الګو برابروي.
3. د رونویسي (Transcription) په جریان کې تولیدیږي.

د DNA تکثیر (Replication)

تعريف: د DNA تکثیر يا کاپي جوړونه هغه پروسه ده چې پکې DNA له خپل ځان څخه يوه دقيقه کاپي جوړوي ترڅو په نوو حجرو کې هم هماغه ميراثي معلومات وساتل شي.

د DNA د تکثیر (Replication) مراحل:

1. د DNA مارپیچ خلاصول: آنزيم هيلیکيز (Helicase) د DNA تارونه يو له بل څخه جدا کوي.
2. د نوي تار جوړول: آنزيم DNA پوليمريز (DNA Polymerase) تکميلي نوکلېوټايډونه هر تار ته زياتوي. آډنين د تيمين سره او گوانين د سايتوزين سره جفتيږي.
3. د دوو DNA مولکولونو جوړښت: په پای کې دوه دوهمتاره DNA مولکولونه جوړېږي، چې هر يو يې يو زاړه او يو نوي تار لري. دې ډول کاپي جوړونې ته نيمه-محافظتي (Semi-conservative) ويل کېږي.

د تکثیر نتيجه

هره نوې حجره هماغه ميراثي معلومات لري چې د مور حجره يې لرل.

د نقل کړې يا رونويسي (Transcription)


تعريف: نقل کړه يا رونويسي هغه پروسه ده چې پکې د DNA معلومات په mRNA کې کښل کېږي ترڅو د پروټين جوړولو لپاره وکارول شي.

2. انتقالي (Transfer RNA) tRNA :

تعريف: tRNA يو کوچنی RNA دی چې امينو اسيدونه ريبوزوم ته رسوي ترڅو د پروټين جوړولو لپاره وکارول شي.

دنده:

1. هر tRNA يو ځانگړی امينو اسيد انتقالوي.
2. انتی کودون لري چې د mRNA کودون سره جفتيږي.
3. په ترجمه (Translation) کې مهم رول لري.



3. ريبوزومي (Ribosomal RNA) rRNA

تعريف: rRNA ريبوزوم اصلي جوړښتي برخه جوړوي.

دندي

1. له پروټينونو سره يوځای کېږي او د ريبوزوم جوړښت تشکیلوي.
2. د ترجمه او پروټين جوړولو ځای دی.
3. د پروټيني غبرگونونو د چټکتيا او تنظيم سبب گرځي.

د DNA د نقل کړې (Transcription) مراحل

1. د DNA تار خلاصول په ځانګړې برخه کې: آنزیم RNA پولیمریز د ژن د پیل ځای سره نښلې او یو تار د الګو په توګه ټاکي.
2. د mRNA جوړول: د RNA نوکلېوټایډونه د تکمیلې قاعدې په اساس د DNA تار سره نښلول کېږي:

○ A په DNA کې U ↔ په RNA کې

○ T ↔ A

○ G ↔ C

○ C ↔ G

د رونویسي پای: کله چې آنزیم د ژن پای ته ورسېږي، mRNA له DNA څخه جلا کېږي.

تشریحي پوښتنې:

- 1 - د DNA جوړښت د هغې اساسي برخو په ذکر سره تشریح کړئ؟
- 2 - د DNA د معلوماتو په اساس د پروټین جوړولو مراحل تشریح کړئ؟

د تشو ځایونو پوښتنې:

1. د DNA جوړښتي واحد _____ نومېږي چې له شکر، د فاسفیت ډله او یو نایتروجن بنسټ څخه جوړ شوی دی.
2. په DNA کې، آډنین (A) همیشه د _____ سره جفتیږي.
3. پروټینونه په هغه حجره کې چې _____ نومېږي جوړېږي.
4. هغه RNA چې د DNA ژنتیکي معلومات ریبوزوم ته انتقالوي، _____ نومېږي.
5. په DNA کې د بنسټونو د ترتیب بدلون چې د میراثي صفاتو په بدلون سبب کېږي، _____ نومېږي.